

Operation af små gevækster

Odsherred Øjenklinik, Algade 10, 4500 Nyk. Sj.,

Tlf. 59 91 16 00

Information vedrørende operation af små gevækster

Operationen indledes med, at område omkring gevæksten afrenses. Derefter indsprøjtes lokalbedøvelse. Når bedøvelsen virker fjernes gevæksten og eventuel blødning stoppes. Der sættes eventuelt nogle få sting. Hvis gevæksten er atypisk og hurtigt voksende sendes denne en såkaldt patologisk undersøgelse. Svar fås typisk efter 2 uger.

Risiko ved operation

Ved ethvert sår inkl. operationssår er der risiko for infektion (se senere). Risiko mindskes ved god hygiejne både før og efter operation. Undgå direkte berøring af operationssåret samt at gøre såret fugtigt i min. 2 døgn.

Ved infektion kan der forventes langsom efterfølgende heling og øget arvæv. Sår kan i øvrigt hele uhensigtsmæssigt med fortykket ar, misfarvning mm. Alle nævnte forholdsregler kan mindske denne risiko.

Forholdsregler før operationen

Man må ikke være overfølsom for lokalbedøvelse.

2 uger før og 1 uge efter operationen skal smertestillende medicin med acetylsalicylsyre (ASA - Kodimagnyl, Aspirin, Treo mm.) undgås, da dette øger blødningstendensen. Det samme gælder gigtmidler som Ibuprofen, Ipren, Voltaren, Diclon mm.

Ved behov for smertestillende medicin kan paracetamol anvendes (Panodil, Pamol, Pinex mm.)

Ved fjernelse af små gevækster er det ikke nødvendigt at pausere med blodfortyndende medicin - er du i tvivl, spørg gerne øjenlægen eller personalet på klinikken. Ved behov for pausering af blodfortyndende medicin, spørg forinden din egen læge, om dette er tilrådeligt.

Forholdsregler på operationsdagen

På operationsdagen fjernes makeup og før fremmøde vaskes ansigtet grundigt.

Alkohol skal undgås, da dette udvider blodkarrene og øger blødningstendensen.

Hvis man tager vanddrivende medicin, må dette ikke tages før efter operationen.

I timerne efter operationen kan der opstå lidt blødning fra såret. Sker dette, skal man sætte sig i en stol og forsigtig presse et rent viskestykke eller lignende mod såret.

Efter operationen

De første dage efter operationen skal man undgå større fysisk aktivitet.

Hvis øjnene evt. føles tørre i perioden efter operationen, kan der dryppes 3 - 6 gange dagligt med viskøse øjendråber. Disse kan købes i håndkøb på apoteket.

De første dage efter operationen kan der være ømhed omkring operationssåret. Som angivet må der kun bruges paracetamol som smertestillende medicin.

Vær opmærksom på tegn på infektion. Det kan være tiltagende rødme, hævelse, varme, smerter og evt. betændelsessekret i såret. Infektion skal behandles med antibiotika som tabletter. En alvorlig infektion kan give uhensigtsmæssigt arvæv. Kontakt øjenklinikken på akut tlf.59 91 16 00 eller kom forbi til kontrol i åbningstiden. I weekend og om aftenen, må vagtlæge evt. kontaktes ved behov.

Eventuelle sting skal fjernes i øjenklinikken ca. 7 – 10 dage efter operationen.